

デング熱・ジカ熱対策

ヒトスジシマカを減らしましょう



デング熱やジカ熱を媒介するヒトスジシマカは空き缶・ゴミやバケツにたまった雨水を好んで産卵します。住まいの周りの溜まり水を徹底的に無くしましょう。

ブルーシート、ゴミ袋の
たるみに溜まった水



虫除けスプレーを使う




虫に刺されないために

成虫、メスが吸血



公園では長袖を着る

植木鉢・じょうろ
くみ置き水



道路の側溝

1~2日後

30日間

サナギ(オニボウフラ)



産卵



たまり水

幼虫(ボウフラ)



6~7日後


1~2日後

たまり水の中の有機物を
食べて成長する

空き缶などに
溜まった水



古タイヤに
溜まった水



ヒトスジシマカ成虫を減らすために

ヒトスジシマカは 主に日中屋外で 活動する蚊です

注意



ヒトスジシマカ

写真提供 国立感染症研究所



アカイエカ

アカイエカはデング熱・ジカ熱と
関係ありません!!

夜、家の中に入ってくる茶色
い蚊はイエカで、デング熱・
ジカ熱を媒介しません。

公園などで遊ぶときの注意


- ◎肌を露出しないように長袖を着ましょう。
- ◎虫よけ剤 **成分名：ディート** を使いましょう。

- 虫よけ剤の持続時間に注意しましょう。
- 小さなお子さんが虫よけ剤を吸い込まないよう、スプレータイプを使うときは、
大人が手で塗ってあげましょう。

参考

小児に対する虫除け剤(ディート)の
使用について

6か月未満の乳児には使用しないこと。
6か月以上2歳未満は、1日1回
2歳以上12歳未満は、1日1~3回



千代田保健所

蚊の相談窓口 (蚊の発生源や駆除について、ご相談ください。)

生活衛生課 環境衛生主査

☎03-5211-8166
でんわ

健康相談窓口 (蚊に刺されて気になるときは、ご相談ください。)

健康推進課 感染症対策主査

☎03-5211-8173
でんわ